



DÉSINFECTANT D'ÉLEVAGE À LARGE SPECTRE

B	V	L	F	Parasites
1 %	2 %	1 %	1,5 %	2 %

Produit
Sélectionné par
GEOSANE



OBJECTIFS ET INTÉRÊTS

- **Efficacité à 1 %** bactéries et levures
- **Efficacité à 2 %** virus et sur les ookystes de *Cryptosporidium parvum* et *Eimeria supp.*
- **Efficacité démontrée sur Mycobacterium** à 1,5 % selon la norme EN14204
- **Efficacité démontrée à 2%** en 1 minute à 10°C (pédiluves) et en 5 min à 10°C (véhicules de transport).

COMPOSITION

Le PROPHYL S est une combinaison synergique de chlorocrésol et d'acide glycolique :

- Chlorocrésol (CAS 59-50-7) : 17,0 % (m/m)
- Acide glycoline (CAS 79-14-1) : 4,9 % (m/m)

MODE D'UTILISATION

Désinfection:

- Diluer **Prophyl S** de 1 à 2 % dans l'eau, selon l'effet recherché, soit 1 L à 2 L pour 100 L de solution.
- Laisser agir de 30 à 60 minutes selon l'effet recherché.



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en volaille chair

Type de sol	Surface au sol	Vol. d'eau	Vol. de Prophyl S à 2%
Terre Battue	1000 m ²	450 litres	9 litres
Béton	1000 m ²	750 litres	15 litres



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en porc

Nombre de places	Vol. de d'eau	Vol. de Prophyl S à 2%
Maternité : 10	72 litres	1,44 litres
Post-Sevrage: 100	45 litres	0,9 litres
Engraissement: 100	90 litres	1,8 litres



Tableau de dosage pour la désinfection des surfaces en bovin

Surface	Surface dév.	Vol. d'eau	Vol. de Prophyl S à 2%
Nurserie : 10 places	100 m ²	30 litres	0,6 litres
Autres : pour 100 m ² au sol	300 m ²	90 litres	1,8 litres

Pour les Coccidies, Cryptosporidies et Ascaris:

- Préparer une solution de **Prophyl S** à 2 %.
- Pulvériser les sols et les murs préalablement nettoyés (à hauteur des animaux) à raison de 0,4 L par m² de surface sur sols béton et à raison de 0,5 L par m² de surface sur les sols en terre battue.
- Laisser agir 4 h minimum à 20°C.



MODE D'UTILISATION

Autres Utilisations:

- Trempage du petit matériel : Préparer une solution de **Prophyl S** de 1 à 2 % selon l'effet recherché, soit de 1 L à 2 L pour 100 L d'eau. Laisser agir 30 minutes minimum. Rincer à l'eau. Augmenter le temps de contact en cas de température basse.
- Sols et abords des bâtiments: Préparer une solution de **Prophyl S** à 2 %. Pulvériser la solution à raison de 0,3 L à 0,5 L /m².
- Désinfection des véhicules de transport d'animaux: Les véhicules doivent d'abord être nettoyés avec une solution détergente. Bien rincer le détergent avant l'application du **Prophyl S**. Utiliser **Prophyl S** à 2 %: 2 L de **Prophyl S** pour 100 L de solution. Pulvériser 0,3 L/m² de solution sur le véhicule.
Laisser agir 5 minutes minimum à 10°C.

RÉGLEMENTAIRE

Biocide TP3. N° d'inventaire: 57325.

PRÉCAUTIONS EN ÉLEVAGE

Condition de stockage et utilisation : Se conserve 3 ans dans son emballage d'origine stocké à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

Ne pas réutiliser l'emballage; Nettoyer les matériels d'application à l'eau; Ne pas appliquer sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation. Lors de l'utilisation de **PROPHYL S**, il est indispensable de revêtir les équipements de protection EPI adaptés:



Combinaison chimique type 4 à usage unique.



Gants nitrile EN 374 (à changer tous les 5 ans ou des l'apparition de signes d'usures)



Lunettes de protection



Masque-complet ou demi-masques avec les cartouches ABEK P



Bidon - Fût

