

FLOR'ENZY +

FLORE DE BARRIERE POUR BÂTIMENT D'ÉLEVAGE

Utilisable
en
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE



OBJECTIFS

Sécurisation sanitaire par implantation d'un biofilm positif sur les surfaces
Limiter le développement des bactéries pathogènes dans l'environnement

COMPOSITION

FLOR'ENZY + contient :

- de l'argile (bentonite)
- des souches de bactéries agissant en synergie :
 - 2 souches de bactéries lactiques
 - 4 souches de Bacillus (dont la souche ISB06)
- des enzymes :
 - Cellulases
 - Xylanases
 - Béta-glucanases
- de l'huile essentielle d'eucalyptus

INTÉRÊTS

1

UN ENVIRONNEMENT PLUS SAIN



- Compétition spatiale et nutritive
- Production de substances inhibitrices

2

UN ENVIRONNEMENT PLUS STABLE



- Litière plus sèche
- Économies de paille

4

DES EFFLUENTS MIEUX VALORISÉS



- Davantage d'azote organique
- Moins de volume à épandre
- Moins de jus au curage, au stockage et à l'épandage

3

UNE AMBIANCE AMÉLIORÉE



- Contribue à limiter les dégagements d'ammoniac
- Plus de confort dans le bâtiment et lors du curage



4 bénéfices complémentaires : hygiène • stabilité • ambiance • valeur agronomique



LA FORCE D'UNE ASSOCIATION MULTI-ESPÈCES

Plusieurs espèces, des fonctions complémentaires



UTILISATION



À LA MISE EN PLACE

Avant l'entrée des animaux : épandre **25 g/m²** sur sol nu, puis **25 g/m²** sur paille fraîche

POULETS



EN ENTRETIEN

25 g/m²
tous les 15 jours



EN CAS SANITAIRES DIFFICILES

25 g/m²
tous les 7 jours

DINDES



EN ENTRETIEN

25 g/m²
toutes les 3 semaines



EN CAS SANITAIRES DIFFICILES

25 g/m²
toutes les 2 semaines

POULES PONDEUSES



EN ENTRETIEN

25 g/m²
toutes les 3 à 4 semaines



EN CAS SANITAIRES DIFFICILES

25 g/m²
toutes les 2 à 3 semaines

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Stockage et Conservation :

Conserver le produit dans un endroit sec à température constante. Garder le sac bien fermé à l'abri de l'humidité pour préserver le complexe bactérien.



Sac

25 kg